

المقاس ١٤ × ٢٠ سم

كلوبيتول®

كريم ومرهم

التركيب:

كل ١٠٠ غ من كلوبيتول كريم أو كلوبيتول مرهم تحتوي على :
كلوبيتازول بروبيونات ٠,٠٥ غ

الخواص:

تنتمي مادة كلوبيتازول بروبيونات إلى مجموعة الكورتيكوستيرويدات التي تساعد في الحد من احمرار وتورم وتهيج الجلد.

الاستطباب:

• الاكزيما المتكررة الانتكاس والصدفية والحزاز المسطح والذئبة الحمراء القرصية والحالات التي لا تستجيب للستيرويدات الأقل فعالية.
• يستخدم للأطفال الذين تزيد أعمارهم عن سنة واحدة للتخفيف من الحكة والالتهابات ولم تستجب لكريمات أو مراهم الستيرويدات الأخف قوة.

مضادات الاستطباب:

• عدوى الجلد (مالم تعالج بالأدوية المضادة للعدوى في نفس الوقت).
• الوردية (وهي حالة تصيب جلد الوجه حيث يصبح للأنف، الخدين، الذقن، الجبين، أو الوجه كله خمرة على غير المعتاد، مع أو بدون أوعية دموية صغيرة واضحة، أو نتوءات (خطاطات) أو تحاديب (بثرات/ حبوب ممتلئة بالصديد).
• حب الشباب.
• الطفح الجلدي حول الفم.
• حكة بالجلد والمناطق التناسلية مع عدم وجود التهاب.
• الأطفال اقل من سنة.

الجرعة والاستخدام:

البالغين والأطفال فوق عمر السنة:

ضع طبقة رقيقة مع التدليك الخفيف، باستخدام ما يكفي فقط لتغطية المنطقة المصابة بالكامل ويستعمل مرة أو مرتين يومياً لمدة أربعة أسابيع. قم بإتاحة الوقت الكافي حتى يتم امتصاص الكريم أو المرهم بعد كل استخدام إذا كنت تستخدم المستحضرات المطرية للجلد.

قد ينخفض عدد مرات استخدام الدواء إذا تحسنت حالة الجلد لديك أو إذا وصف لك طبيبك دواء ستيرويدي أضعف كبديل لتستخدمه.

التحذيرات:

- يستعمل بحذر لدى الأشخاص الذين عانوا سابقاً من تحسس

لأي نوع من أنواع الأدوية الكورتيكوستيرويدية ويوقف استعماله في حال ظهور أعراض فرط التحسس بعد استخدام الكريم أو المرهم (يجب استشارة الطبيب في هذه الحالة).
- إذا نسيت استخدام الدواء قم باستخدامه كالمعتاد. ولا تضع كمية إضافية من الدواء لتعويض الجرعات التي نسيتها.
- لا تتوقف عن استخدام الدواء إلا بعد استشارة الطبيب.
- أبلغ طبيبك إذا لم تتحسن حالتك في غضون ٢-٤ أسابيع من العلاج.

- لا تستخدم ضمادات محكمة فوق الكريم أو المرهم إلا إذا كان طبيبك قد أوصاك بذلك، وبالأخص لدى الأطفال، إذا كنت ستستخدم الكريم أو المرهم تحت ضمادات محكمة، بما في ذلك الحفاضات الخاصة بالأطفال، تأكد من نظافة الجلد قبل وضع ضمادة جديدة لتجنب العدوى.
- للاستعمال الخارجي فقط.

التداخل الدوائي:

أخبر طبيبك في حال تناولك أدوية مثل ريتونافير وإتراكونازول لأنها قد تزيد من احتمالات ظهور الآثار الجانبية.

الحمل والارضاع:

يستخدم بعد استشارة الطبيب.
في حالات الارضاع يجب تجنب تطبيق الدواء على منطقة الثدي لضمان عدم وصول الدواء لثمن الطفل.

الآثار الجانبية:

تظهر في حالات قليلة جداً:
- ترقق وضمور الجلد وظهور أوعية دموية تحت سطح الجلد.
- علامات مثل زيادة الوزن واستدارة الوجه وجفاف الجلد وتجمع الجلد وتغييرات في اللون وتزايد شعر الجسم و تقصف الشعر.

- قد نلاحظ في بعض الحالات احمرار وطفح جلدي.
في حال لاحظت أي من هذه الآثار الجانبية لا توقف العلاج إلا بعد استشارة الطبيب.

التخزين:

يحفظ في درجة حرارة لا تزيد عن ٣٠°م.

التعبئة:

تيوب ألومنيوم سعة ٢٠ غ.

١- الدواء مستحضر يؤثر على صحتك، واستهلاكه خلافاً للتعليمات يعرضك للخطر.

٢- يحفظ بعيداً عن متناول الأطفال.

Freesia
Pharmaceutical Industries

إنتاج فريسيا فارما
اليمن - صنعاء
www.freesiapharma.com

المقاس ١٤ × ٢٠ سم

CLOBETOL[®]

Cream and Ointment

Composition:

Each 100 g of Clobetol Cream or Clobetol Ointment contains:
Clobetasol Propionate 0.05 g

Properties:

Clobetasol Propionate is very potent topical corticosteroid for the relief of the inflammatory and pruritic manifestations of steroid responsive dermatoses.

Indications:

- Psoriasis, Recalcitrant dermatoses, Lichen planus, Discoid lupus erythematosus, other skin conditions which do not respond satisfactorily to less potent steroids.
- It is used for children over 1 year for the relief of the inflammatory and pruritic manifestations of steroid responsive dermatoses and they did not respond to less potent steroids.

Contraindications:

- Untreated cutaneous infections.
- Rosacea.
- Acne vulgaris.
- Perioral dermatitis.
- Perianal and genital pruritus.
- Children under one year of age.

Dosage and Administration:

Adults, Elderly and Children over a year:

Apply thinly and gently rub in using only enough to cover the entire affected area once or twice a day for up to 4 weeks until improvement occurs, then reduce the frequency of application or change the treatment to a less potent preparation. Allow adequate time for absorption after each application before applying an emollient.

Precautions:

- Clobetol should be used with caution in patients with a history of local hypersensitivity to corticosteroids. In case of hypersensitivity, stop

the treatment and consult your doctor.

- In case of missing dose, go on usual dose, (do not increase the amount of Clobetol Cream or Ointment)
- Ask your doctor before stopping Clobetol Cream or Ointment.
- If no improvement occurs within 2 – 4 weeks, consult your doctor.
- Do not use occlusive dressing or bandages over the cream or ointment without doctor advice, mainly for children, when using occlusive dressings, including children diaper, the skin should be cleansed before a fresh dressing is applied.
- For external use only.

Interactions:

Consult your doctor if you administered medicines like (Ritonavir or Itraconazole), as it may increase the side effects.

Pregnancy and lactation:

Clobetol Cream and Ointment can be used after doctor consultation.

During lactation, Clobetol should not be applied to the breasts to avoid accidental ingestion by infants.

Adverse Reactions:

In rare cases, these reactions may appear:

- Skin atrophy, telangiectasia.
- Moon face, obesity, skin dryness and striae, pigmentation changes, hypertrichosis, trichorrhexis.
- Skin irritation, erythema and skin rash also may appear.

Ask a doctor before stopping the treatment in case of one of adverse reactions appears.

Storage:

store below 30°C.

Packaging:

Aluminum tube of 20 g.

- 1- Medicament is a product which affects your health, and its consumption contrary to instructions is dangerous for you.
- 2- Keep out of reach of children.

Freesia
Pharmaceutical Industries

Produced by Freesia Pharma
Yemen - Sana'a
www.freesiapharma.com