

المقاس ١٤ × ٢٠ سم

إليكازون® كريم ومرهم

التركيب:

كل ١٠٠ غ من إيكازون كريم أو إيكازون مرهم تحتوي على:
موميتازون فيروات ٠,١ غ

الخواص:

موميتازون فيروات مثل باقي الكورتيكوستيرويدات الموضعية له تأثير مضاد للالتهاب والحكة وقابض للأوعية الدموية وذلك من خلال التحكم في إفراز الوسائط المسؤولة عن الالتهابات مثل البروستاجلاندينات والليوكوترينات.

الاستطباب:

- يستخدم إيكازون كريم أو إيكازون مرهم لعلاج الالتهاب والحكة الجلدية المستجيبة للعلاج بالكورتيكوستيرويدات الموضعية كالمهنية والتهابات الجلد السطحية.

الجرعة وطريقة الاستعمال:

- توضع طبقة رقيقة من إيكازون كريم أو مرهم على طبقة الجلد المصابة مرة واحدة أو مرتين يومياً أو حسب إرشادات الطبيب.
- يستخدم إيكازون كريم أو إيكازون مرهم بالجرعة الاعتيادية للمرضى الذين أعمارهم أكثر من سنتين ويستخدم لفترات علاجية قصيرة ومساحات تطبيق صغيرة لدى الرضع والأطفال الذين أعمارهم أقل من سنتين.

الحمل والإرضاع:

- كما في كل الكورتيكوستيرويدات الموضعية فإن هذه المستحضرات تستخدم في حالات الحمل بكميات قليلة وفترات علاجية قصيرة.
- لا يعرف ما إذا كان الامتصاص العام للستيرويدات القشرية الموضعية يكفي لإفراز كميات ملحوظة في حليب الأم. لذا يجب اتخاذ قرار إما بوقف الرضاعة أو وقف العلاج وذلك وفقاً لأهمية الدواء بالنسبة للأم.

التحذيرات:

- يزداد الامتصاص العام للستيرويدات القشرية الموضعية عند علاج مساحات كبيرة من الجلد.
- الاستعمال الموضعي لدى الأطفال يجب ان يكون مقصوداً على المقدار الأدنى المتفق مع النظام العلاجي الفعال.
- في حال حدوث تهيج أو تحسس عند استعمال كريم أو مرهم إيكازون، يجب إيقاف استعمال الدواء.
- الاستعمال الموضعي لمدة طويلة وبكميات زائدة ينتج عنه قصور كظري ثانوي.
- للاستعمال الخارجي فقط.

موانع الاستعمال:

يجب عدم استعمال إيكازون كريم أو مرهم للمرضى الذين لديهم حساسية لمادة الموميتازون فيروات أو أي من الكورتيزونات الأخرى أو مع أي عنصر من مكونات هذه التركيبة. وكذلك في حالات عدوى الجلد الفيروسية والفطرية وتدرن الجلد والحلأ النطاقي البسيط.

الأثار الجانبية:

نادراً ما سجلت آثار جانبية مع الموميتازون فيروات ٠,١% وتتضمن: حرقة، حكة، تسعة، علامات ضمور الجلد، التهاب الجريبات، زيادة الشعر، التهاب ثانوي.

التخزين:

يحفظ في درجة حرارة بين ١٥ - ٣٠ °م.

التعبئة:

تيوب ألتنيوم سعة ٢٠ غ.

١- الدواء مستحضر يؤثر على صحتك، واستهلاكه خلافاً للتعليمات يعرضك للخطر.
٢- يحفظ بعيداً عن متناول الأطفال.

Freesia
Pharmaceutical Industries

إنتاج فريسيا فارما
اليمن - صنعاء
www.freesiapharma.com

المقاس ١٤ × ٢٠ سم

Elicasone[®] **Cream and Ointment**

Composition:

Each 100 g of Elicasone Cream or Elicasone Ointment contains:

Mometasone Furoate 0.1 g

Properties:

Like other topical corticosteroids, Mometasone Furoate has anti-inflammatory, anti-pruritic, and vasoconstrictive properties through controlling the biosynthesis of potent mediators of inflammation such as prostaglandins and leukotrienes.

Indications:

- Elicasone is indicated for the relief of the inflammatory and pruritic manifestations of corticosteroid responsive dermatosis, such as psoriasis and atopic dermatitis.

Dosage and Administration:

Apply a thin layer of Elicasone Cream or Ointment to the affected skin area once daily or twice, or director by a doctor.

Elicasone is used with normal dosage in patients 2 years of age or older and used with short period of treatment and small application area in infants or children less than 2 years old.

Pregnancy and Lactation:

- As all other topical corticosteroids, drugs of this class should not be used by pregnant women in large amounts or for prolonged periods.
- It is not known whether topical administrations of corticosteroids could result in sufficient systemic absorption to produce detectable quantities in the breast milk, thus a decision should be made whether to discontinue nursing or to discontinue the drug taking into

account the importance of the drug to the mother.

Precautions:

- Systemic absorption of topical corticosteroid will be increased when used on larger area of the body.
- Use of topical corticosteroid in children should be limited to the least amount compatible with an effective therapeutic regimen.
- If irritation or sensitization develops with use of Elicasone, treatment should be discontinued.
- Excessive prolonged use of topical corticosteroid can suppress HPA axis resulting in secondary adrenal insufficiency.
- For external use only.

Contraindications:

Elicasone Cream or Ointment is contraindicated in patients who are hypersensitive to Mometasone Furoat, to other corticosteroids, or to any ingredient in this preparation. It is also contraindicated in cases of fungal, viral tubercular skin lesions, herpes simplex or zoster.

Adverse Reactions:

Very rarely, local adverse reactions are reported with Mometasone Furoat 0.1% including skin burning, pruritus, stinging and signs of skin atrophy, folliculitis, hypertrichosis, and secondary infections.

Storage:

Store between 15 - 30°C.

Packaging:

Aluminum tube of 20 g.

- 1- Medicament is a product which affects your health, and its consumption contrary to instructions is dangerous for you .
- 2- Keep out of reach of children.

Freesia
Pharmaceutical Industries

Produced by Freesia Pharma
Yemen - Sana'a
www.freesiapharma.com