

المقاس ١٤ × ٢٠ سم

إليكازون-S® مرهم

التركيب:

كل ١٠٠ غ من إيكازون-S مرهم تحتوي على:
موميتازون فيروات ٠,١ غ
ساليسليك أسيد ٥ غ

الخواص:

موميتازون فيروات مثل باقي الكورتيكوستيرويدات الموضعية له تأثير مضاد للالتهاب والحكة وقابض للأوعية الدموية وذلك من خلال التحكم في إفراز الوسائط المسؤولة عن الالتهابات مثل البروستاجلاندينات والليوكوترينات. تساعد مادة الساليسليك أسيد في التخلص من الجلد الجاف والمتقشر كما تزيد من امتصاص مادة الموميتازون فيروات.

الاستخدام:

- يستخدم إيكازون-S مرهم لعلاج الإلتهاب والحكة الجلدية المستجيبة للعلاج بالكورتيكوستيرويدات الموضعية كالصدفية والتهابات الجلد السطحية. وبالأخص في الحالات المترافقة مع وجود تقرن أو تقشر في الجلد.

الجرعة وطريقة الاستعمال:

- توضع طبقة رقيقة من إيكازون-S مرهم على الجلد المصاب مرة أو مرتين يومياً أو حسب إرشادات الطبيب.
- يستخدم إيكازون-S مرهم بالجرعة الاعتيادية للمرضى الذين أعمارهم أكثر من ١٢ سنة.

الحمل والإرضاع:

- كما في كل الكورتيكوستيرويدات الموضعية فإن هذه المستحضرات تستخدم في حالات الحمل بكميات قليلة ولفترات علاجية قصيرة.
- لا يعرف ما إذا كان الامتصاص العام للستيرويدات القشرية الموضعية يكفي لإفراز كميات ملحوظة في حليب الأم. لذا يجب اتخاذ قرار إما بوقف الرضاعة أو وقف العلاج وذلك وفقاً لأهمية الدواء بالنسبة للأم.

التحذيرات:

- يزداد الامتصاص العام للستيرويدات القشرية الموضعية عند علاج مساحات كبيرة من الجلد.
- يجب عدم إيقاف الدواء بشكل مفاجئ ولكن يتم إيقافه بشكل تدريجي (تخفيف الجرعة قبل الإيقاف).
- في حال حدوث تهيج أو تحسس عند استعمال إيكازون-S مرهم، يجب إيقاف استعمال الدواء.
- الاستعمال الموضعي لمدة طويلة وبكميات زائدة ينتج عنه قصور كظري ثانوي.
- للاستعمال الخارجي فقط.

موانع الاستعمال:

يجب عدم استعمال إيكازون-S مرهم للمرضى الذين لديهم حساسية لمادة الساليسليك أسيد أو الموميتازون فيروات أو أي من الكورتيكوستيرويدات الأخرى أو مع أي عنصر من مكونات هذه التركيبة. وكذلك في حالات عدوى الجلد البكتيرية والفيروسية والفطرية وتدرن الجلد والحلأ النطاقي البسيط.

الآثار الجانبية:

يمكن وفي حالات قليلة أن تظهر بعض الآثار الجانبية مع استعمال إيكازون-S مرهم وتتضمن: حرقة، حكة، تسعة، علامات ضمور الجلد، التهاب الجريبات، زيادة الشعر، التهاب ثانوي.

التخزين:

يحفظ في درجة حرارة بين ١٥ - ٣٠ °م.

التعبئة:

تيوب ألومنيوم سعة ٢٠ غ.

١- الدواء مستحضر يؤثر على صحتك، واستهلاكه خلافاً للتعليمات يعرضك للخطر.
٢- يحفظ بعيداً عن متناول الأطفال.

Freesia
Pharmaceutical Industries

إنتاج فريسيا فارما
اليمن - صنعاء
www.freesiapharma.com

المقاس ١٤ × ٢٠ سم

Elicasone-S[®] Ointment

Composition:

Each 100 g of Elicasone-S Ointment contains:

Mometasone Furoate	0.1 g
Salicylic Acid	5 g

Properties:

Like other topical corticosteroids, Mometasone Furoate has anti-inflammatory, anti-pruritic, and vasoconstrictive properties through controlling the biosynthesis of potent mediators of inflammation such as prostaglandins and leukotrienes.

Salicylic acid helps to remove dry and scaling skin, it increases the uptake of Mometasone Furoate.

Indications:

- Elicasone-S Ointment is indicated for the relief of the inflammatory and pruritic manifestations of corticosteroid responsive dermatosis, such as psoriasis and atopic dermatitis. Especially in case of intensive scaling skin.

Dosage and Administration:

Apply a thin layer of Elicasone-S Ointment to the affected skin area once or twice daily, or as directed by a doctor.

Elicasone-S Ointment is used with normal dosage in patients 12 years of age or older.

Pregnancy and Lactation:

- As all other topical corticosteroids, drugs of this class should not be used by pregnant women in large amounts or for prolonged periods.
- It is not known whether topical administrations of corticosteroids could result in sufficient systemic absorption to produce detectable

quantities in the breast milk, thus a decision should be made whether to discontinue nursing or to discontinue the drug taking into account the importance of the drug to the mother.

Precautions:

- Systemic absorption of topical corticosteroid will be increased when used on larger area of the body.
- Do not interrupt treatment suddenly, treatment should be discontinued gradually.
- If irritation or sensitization develops with use of Elicasone-S Ointment, treatment should be discontinued.
- Excessive prolonged use of topical corticosteroid can suppress HPA axis resulting in secondary adrenal insufficiency.
- For external use only.

Contraindications:

Elicasone-S Ointment is contraindicated in patients who are hypersensitive to salicylic acid, to Mometasone Furoate, to other corticosteroids, or to any ingredient in this preparation. It is also contraindicated in cases of fungal, viral tubercular skin lesions, herpes simplex or zoster.

Adverse Reactions:

Local adverse reactions are reported in few cases with Elicasone-S Ointment including skin burning, pruritus, stinging and signs of skin atrophy, folliculitis, hypertrichosis, and secondary infections.

Storage: Store between 15-30°C.

Packaging: Aluminum tube of 20 g.

- 1- Medicament is a product which affects your health, and its consumption contrary to instructions is dangerous for you.
- 2- Keep out of reach of children.

Freesia
Pharmaceutical Industries

Produced by Freesia Pharma
Yemen - Sana'a
www.freesiapharma.com