

المقاس ٥, ١٥ سم × ٤, ٢٢ سم

فريكومب® كريم ومرهم

مضاد حيوي - مضاد لإلتهابات الجلد

التركيب:

كل ١ جرام من فريكومب كريم أو فريكومب مرهم يحتوي على:	
نيستاتين	١٠٠,٠٠٠ وحدة
نيومايسين	٢,٥ مجم
جراميسيدين	٠,٢٥ مجم
تراي امسينولون أسيتونايد	١ مجم

الخواص:

يعتبر فريكومب كريم وفريكومب مرهم مضاد للإلتهابات، مضاد للحكة، مضاد للبكتيريا ومضاد للفطريات، فهو يستخدم في تخفيف حالات الإلتهاب الجلد والحكة الجلدية.

- تراي أمسينولون أسيتونايد: كورتيكوستيرويد فعال كمضاد للإلتهاب ومضاد للحساسية.

- نيساتين: مضاد للفطريات يتميز بنشاط خاص ضد المبيضات (الكانديدا).

- نيوماسين وجراميسيدين: مضادان حيويان يمتلكان خواص مضادة لعدد كبير من البكتيريا الموجبة والسالبة الغرام.

الاستخدام:

فريكومب كريم وفريكومب مرهم، تستخدم في علاج الإلتهابات الجلد خصوصاً عندما تكون مصاحبة بمدوى فطرية أو بكتيرية كما في الحالات التالية:

- الإلتهابات الجلد مثل (الإلتهابات الجلدية التماسية والإلتهابات الجلد الدهنية والإلتهابات الجلد العصبية).

- حالات الأكزيما مثل (الأكزيما الركودية وأكزيما الأطفال والأكزيما المترافقة مع المدوى عقب التعرض للإصابات).

- الإلتهابات البكتيرية السطحية.

- الإلتهابات الجلد المسببة بفطريات المبيضات.

- الصدفية.

الأعراض الجانبية:

يمكن أن تظهر في حالات قليلة بعد الاستعمال الموضعي للكورتيكوستيرويدات أعراض جانبية مثل (حرقة، حكة، تهيج، جفاف، زيادة نمو الشعر، تغير في صبغة الجلد، الإلتهابات سطحية تحسسية، الإلتهابات ثانوية، ضمور الجلد).

النيساتين جيد التحمل ويمكن أن تظهر مع الاستخدام الطويل حالات تهيج والإلتهاب الجلد السطحي.

يمكن أن تظهر بعض حالات التحسس لكل من النيومايسين والجراميسيدين.

موانع الاستعمال:

يجب عدم استعمال فريكومب في الحالات التالية:

- الإلتهابات الجلد الفطرية الغير مستجيبة للنيساتين.

- الإصابات الفيروسية وبالأخص الحلاّ النطاقي البسيط (الهربس) والقوباء والحماق.

- الإلتهابات الجلد السلية.

- فرط التحسس لأي من مكونات المستحضر.

- يمنع استعمال المستحضر على العينين أو في القناة السمعية الخارجية لدى المرضى الذين يعانون من ثقب في طبلة الأذن.

الجرعة وطريقة الاستعمال:

تدهن طبقة رقيقة من فريكومب كريم أو فريكومب مرهم على المنطقة المصابة مرتين أو ثلاث مرات يوميا، أو حسب إرشادات الطبيب.

الأطفال: لا يوصى باستخدام هذا الدواء للأطفال ممن أعمارهم أقل من سنة واحدة، وعند استخدامه للأطفال ممن أعمارهم أكبر من سنة يجب استخدامه بأقل جرعة ممكنة ولفترة قصيرة.

كبار السن: يستخدم بجرعات قليلة ولفترات علاجية قصيرة.

الرحمل والإرضاع:

- تستخدم في حالات الحمل بكميات قليلة ولفترات علاجية قصيرة وعندما تكون الفائدة المتوقعة أكبر من الضرر المحتمل.

- ليس معلوماً ما إذا كان الامتصاص العام للستيرويدات القشرية الموضعية يكفي لإفراز كميات يمكن اقتناؤها في لبن الأم. لذا يجب اتخاذ قرار إما بوقف الرضاعة أو وقف العلاج وذلك وفقاً لأهمية الدواء بالنسبة للأم.

الاحتياطات:

- إن الاستعمال المفرط لمستحضر فريكومب يسرع في تكاثر الجراثيم الغير حساسة للمستحضر كالفطريات التي لا تنتمي إلى مجموعة المبيضات.

- إذا لم يستجب المريض للعلاج بسرعة ينصح بوقف فريكومب حتى يتم التحكم بالإلتهاب.

- يتم إيقاف العلاج أيضاً إذا ظهرت تفاعلات تحسسية.

- يجب عدم استعمال فريكومب للمرضى المصابين بتهتك شديد للجلد لأن امتصاص مادة النيومايسين. وتراي أمسينولون قد يؤدي إلى ضرر كلوي أو ضرر سمعي أو ظهور الآثار الجانبية للكورتيكوستيرويدات.

- عدم استخدام ضمادات عازلة للتقليل من نسب الامتصاص وتفاعلات التحسس.

- تجنب ملامسته للمين.

- للاستعمال الخارجي فقط.

التخزين: يحفظ في درجة حرارة بين ١٥ - ٣٠ م°.

العبوة: تيوب ألنيوم يحتوي على ١٥ غ.

١- الدواء مستحضر يؤثر على صحتك، واستهلاكه خلافاً للتعليمات يعرضك للخطر.

٢- يحفظ بعيداً عن متناول الأطفال.

Freesia
Pharmaceutical Industries

إنتاج فريسيا فارما
اليمن - صنعاء
www.freesiapharma.com

Frecomb[®] Cream & Ointment

Topical Anti-inflammatory & Antibiotic

Composition:

Each 1 gram of Frecomb Cream or Frecomb Ointment contains:

Nystatin	100,000 Units
Neomycin	2.5 mg
Gramicidin	0.25 mg
Triamcinolone Acetonide	1 mg

Properties:

Frecomb cream or ointment is an anti-inflammatory, antipruritic, antibacterial and antifungal drug, which is used for the relief of the inflammatory and pruritic manifestations of dermatoses.

- Triamcinolone Acetonide is an effective corticosteroid that acts as anti-inflammatory, antipruritic, and anti-allergic.
- Nystatin is an antifungal agent characterized by specific anticandidal activity.
- The two antibiotics (Neomycin and Gramicidin) provide together antibacterial properties which cover a wide range of gram-positive and gram-negative microorganisms.

Indications:

Frecomb is indicated in the treatment of inflammatory skin lesions, particularly when accompanied by fungal or bacterial infections, such as:

- Skin dermatosis like (atopic dermatitis, contact dermatitis, neurodermatitis, and seborrheic dermatitis).
- Eczema like (stasis eczema, children eczema and post-traumatic infective eczema).
- Surface bacterial infections.
- Skin candidiasis.
- Psoriasis.

Side effects:

The following adverse reactions have been reported with topical corticosteroid:

Burning, itching, irritation, dryness, hypertrichosis, change skin pigmentation, allergic contact dermatitis, secondary infection, skin atrophy.

Nystatin is well tolerated even with prolonged therapy. Irritation and cases of contact dermatitis have been reported.

Sensitivity reactions to Gramicidin and Neomycin have been reported.

Contraindications:

Frecomb should not be used in the following cases:

- Fungal infection not susceptible to Nystatin.

- Viral skin infections mainly, Herpes simplex, vaccinia and varicella.
- Tubercular infections of the skin.
- Hypersensitivity of any product ingredients.
- Contraindicated in the eyes and external auditory canal in patients with perforated ear drum.

Dosage and Administration:

Apply a thin film of Frecomb cream or ointment on the affected area 2 or 3 times daily, or as directed by a doctor.

Children: These products are not recommended for children under one year. For children more than one year, it should be used with little dosages and short periods.

Elderly: It should be used with little dosages and short periods.

Pregnancy and Lactation:

- This drug should be used by pregnant women in little amounts and short periods of treatment and when the benefits outweighs the potential risk.
- It is not known whether topical administrations of corticosteroids could result in sufficient systemic absorption to produce detectable quantities in the breast milk, thus a decision should be made whether to discontinue nursing or to discontinue the drug taking into account the importance of the drug to the mother.

Precautions:

- The prolonged use of Frecomb may lead to development of non-sensitive microorganisms including fungi not belonging to the Candida species.
- If the patient does not respond rapidly, Frecomb should be discontinued until the infection has been controlled.
- The treatment should be discontinued if any local irritation or sensitivity reaction appears.
- Frecomb should be avoided in patients with extensive skin damage, because the absorption of Neomycin and Triamcinolone can possibly lead to nephrotoxicity, ototoxicity or appearance of corticosteroidal side effect.
- The use of occlusive dressing should be avoided because of the increase risk of sensitivity.
- Do not use in eyes.
- For external use only.

Storage: Store between 15 – 30°C.

Packaging: Aluminum tube of 15g.

1- Medicament is a product which affects your health, and its consumption contrary to instructions is dangerous for you .
2- Keep out of reach of children.

**Freesia**
Pharmaceutical Industries

Produced by Freesia Pharma
Yemen - Sana'a
www.freesiapharma.com