

المقاس ٥, ١٥ سم × ٤, ٢٢ سم

## فريبروكت® مرهم علاج موضعي للبواسير

التركيب:

كل ١٠٠ غ من المرهم تحتوي على:

- كالسيوم دوبيسلات مونوهيدرات ٤ غ

- ليدوكائين هيدروكلوريد ٢ غ

- دكساميتازون أسيتات ٠,٢٥ غ

الخواص:

كالسيوم دوبيسلات يعمل على جدران الشعيرات الدموية عن طريق تنظيم وظائفها الفسيولوجية الضعيفة مثل: زيادة النفاذية وتقليل المقاومة ويعمل على علاج الأعراض المختلفة للالتهابات. ليدوكائين هيدروكلوريد مخدر موضعي يعمل على تخفيف الألم. دكساميتازون أسيتات هو كورتيكوستيرويد للاستخدام الموضعي وهو مضاد للالتهابات ومضاد للحكة. فريبروكت يقلل الالتهابات وورشح السائل المصلي ويخفف بشكل كبير وسريع الأعراض المرتبطة بالالتهابات في المنطقة الشرجية مثل الألم والحرقنة والاحساس بالتوتر.

الحركية الدوائية:

المواد الفعالة في مرهم فريبروكت يعاد امتصاصها بشكل جزئي بواسطة الجلد.

الاستطباب:

للبواسير الداخلية والخارجية، الحكة الشرجية، الأكزيما الشرجية، تشققات الشرج، العلاج قبل وبعد عملية استئصال البواسير.

الجرعة والاستخدام:

مرتين إلى ثلاث مرات يومياً.

يستخدم في الصباح وقبل النوم، إذا أمكن بعد التغوط، يستخدم المحقن بواسطة تبيته على التيوب. أدخل المحقن إلى أعماق نقطة ممكنة في منطقة

الشرج واضغط بلطف على التيوب أثناء سحبه . في حالة البواسير الخارجية والحكة الشرجية استخدم كمية قليلة من المرهم عدة مرات يومياً.

يجب إعلام الطبيب في حالة إذا لم يتم تحسن المريض أو ساءت حالته.

موانع الاستخدام:

الحساسية المفرطة تجاه مكونات فريبروكت.

الاحتياطات:

- في حالة القصور الكلوي يجب عدم استخدام فريبروكت لفترات طويلة.  
- تجنب العلاج طويل الأمد.

الحمل والإرضاع:

الحمل فئة C. فريبروكت يستخدم خلال فترة الحمل بعد استشارة الطبيب.  
لا يعلم ما إذا كان الكالسيوم دوبيسلات له إفراز في الحليب بعد الاستخدام الموضعي. ليدوكائين هيدروكلوريد ودكساميتازون أسيتات له إفراز في حليب الأمهات.

الآثار الجانبية:

سجلت حالات نادرة جداً: خلل في حركية الأمعاء، شعور بحرقنة مؤقتة، ألم موضعي، تفاعل فرط الحساسية، الحمى، في هذه الحالة يجب إيقاف العلاج واستشارة الطبيب.

الحفظ:

يحفظ في درجة حرارة أقل من ٣٠° م.

التعبئة:

تيوب ألنيوم سعة ٢٠ غ.

١-الدواء مستحضر يؤثر على صحتك، واستهلاكه خلافاً للتعليمات يعرضك للخطر.  
٢- يحفظ بعيداً عن متناول الأطفال.

**Freesia**  
Pharmaceutical Industries

**إنتاج فريسيا فارما**  
اليمن - صنعاء  
www.freesiapharma.com

# Freproct<sup>®</sup> ointment

## Local Treatment of Haemorrhoids

### Composition :

Each 100 g of ointment contains:

Calcium dobesilate monohydrate	4 g
Lidocaine hydrochloride	2 g
Dexamethasone acetate	0.0 25 g

### Properties:

Calcium dobesilate acts on the capillary walls by regulating their impaired physiological functions, such as increased permeability and decreased resistance and treat different signs of inflammations.

Lidocaine hydrochloride is a local anesthetic, contributes to relieve pain.

Dexamethasone acetate is a corticosteroid for topical use , possesses anti-inflammatory and antipruritic actions .

Freproct reduces inflammation, oozing of serous fluids and brings a rapid relief of the signs and symptoms linked to inflammation of the anal region , such as pain , burning , pruritus and sensation of tension.

### Pharmacokinetics:

The active materials contained in Freproct are partly reabsorbed by the skin.

### Indications and usage :

Internal and external haemorrhoids , anal pruritus ,anal eczema , anal fissure and Pre- and postoperative treatment in cases of hemorrhoidectomy.

### Dosage and administration:

2-3 times daily

In the morning and at bedtime apply, if possible after defecation.

Use the applicator by screwing it to the tube, insert the applicator as deep as possible in the anus then press gently the tube while withdrawing it.

In case of external haemorrhoids or anal pruritus, apply a thin layer of the ointment several times a day.

The doctor must be informed, if the symptomatology has not improved or has worsened.

### Contraindication:

Hypersensitivity towards the components of Freproct .

### Precautions :

- In case of renal insufficiency, Freproct should not be used during longer periods.
- Avoid long-lasting treatments .

### Pregnancy and Lactation :

#### Pregnancy category C:

Freproct should be administered during pregnancy after a doctor consultation.

It is not known whether calcium dobesilate is excreted with milk after topical application.

Lidocaine hydrochloride and dexamethasone acetate are excreted in the maternal milk.

### Adverse reactions:

Very rare cases have been reported: modifications of the intestinal transit, temporary burning sensation, local pain hypersensitivity reactions, fever, in these cases the treatment must be discontinued, and consult your doctor .

### Storage:

Store below 30 °C.

### Packaging:

A tube of 20 g.

1- Medicament is a product which affects your health, and its consumption contrary to instructions is dangerous for you .  
2- Keep out of reach of children.

**Freesia**  
Pharmaceutical Industries

Produced by Freesia Pharma  
Yemen - Sana'a  
[www.freesiapharma.com](http://www.freesiapharma.com)