

# أوتيك® قطرة أذنية

التركيب :

كل ١٠٠ مل من أوتيك قطرة أذنية تحتوي على:  
 فينازون ..... ٤ غ  
 ليدوكايين هيدروكلورايد ..... ١ غ  
 الصبغة.

الخصائص الدوائية :

أوتيك قطرة أذنية تعمل كمسكن ألم و مضاد التهاب قوي. يبدأ تأثير الدواء (إزالة الألم وتخفيف الالتهاب) بعد (٥) دقائق من استعمال القطرة، ويختفي الألم في غضون (١٥) دقيقة.

الاستطباب :

علاج موضعي ومسكن في الحالات التالية:  
 - التهاب الأذن الوسطى الحاد.  
 - التهاب الأذن الناتج عن مضاعفات الانفلونزا.  
 - التهاب الأذن بالرضح الضغطي (التهابات الأذن الناتجة من الضغط).

مضادات الاستطباب :

- حالات تضرر غشاء الطبقة الانتانية أو الرضحي (الناتج عن مؤثر خارجي).  
 - فرط التحسّس ناتجة الليدوكاين أو لأي مكون من مكونات المستحضر.

التحذيرات :

- في حالات الحمل والارضاع ينصح باستشارة الطبيب قبل استخدام الدواء.  
 لا يوجد معلومات حول موانع الاستخدام أثناء فترة الحمل والإرضاع.  
 - يجب التأكد من سلامة غشاء الطبقة قبل مباشرة.

- ١- الدواء مستحضر يؤثر على صحتك، واستهلاكه خلافاً للتعليمات يعرضك للخطر.  
 ٢- يحفظ بعيداً عن متناول الأطفال.



إنتاج فريسيما فارما  
اليمن - صنعاء  
www.freesiapharma.com

# **OTIC® Ear drops**

## **Composition:**

Each 100 g of OTIC ear drops contains:  
Phenazone ..... 4 g  
Lidocaine hydrochloride ..... 1 g

## **Pharmacological properties:**

OTIC is a strong analgesic with anti-inflammatory effect. The action of drug (relieving of pain and reduction of inflammation) starts 5 minutes after the instillation and the pain disappears within 15-30 minutes.

## **Indications:**

Local symptomatic treatment and analgesia in:  
• Acute medium Otitis.  
• Otitis as a complication after flu.  
• Barotraumatic Otitis.

## **Contraindications:**

- Infectious or traumatic injury of the tympanic membrane.  
- Hypersensitivity to Lidocaine or other components of the drug.

## **Precautions:**

- In pregnancy or breastfeeding cases, consult a doctor before using the drug.  
There are no data about contraindications for using the drug during pregnancy or breast feeding.  
- Before instilling the drug, it is

necessary to check the integrity of tympanic membrane.

- For any previous allergic reactions, consult a doctor.
- Do not use the drug after 1 month of first opening.

## **Interactions:**

- Local application of drug causes no interactions with other drugs.
- In case of taking other drugs, inform a doctor.

## **Dosage and Administration:**

For adults and infants, instill 3-6 drops two to three times per day into the external auditory passage.  
The course of treatment should not exceed 10 days.  
After each using, close the white cap of the dropper.

## **Side effects:**

- Local reaction as irritation and itches are very rare.
- In case of undesirable reaction, stop using this drug and inform the doctor immediately.

## **Storage conditions:**

Store at temperature below 25 °C, protected from light.

## **Packaging:**

10 ml ear dropper.

- |  |
|--|
| <p>1- Medicament is a product which affects your health, and its consumption contrary to instructions is dangerous for you .<br/>2- Keep out of reach of children.</p> |
|--|



Produced by Freesia Pharma  
Yemen - Sana'a  
[www.freesiapharma.com](http://www.freesiapharma.com)