

Elicasone-M[®] Cream

Composition:

Each 100 g Elicasone-M Cream contains:

Mometasone Furoate	0.1 g
Miconazole Nitrate	2 g

Properties:

Like other topical corticosteroids, Mometasone Furoate has anti-inflammatory, anti-pruritic, and vasoconstrictive properties through controlling the biosynthesis of potent mediators of inflammation such as prostaglandins and leukotrienes.

Miconazole Nitrate is an antifungal with a broad effect on pathogenic fungi, including yeasts and dermatophytes.

Indications:

Elicasone-M cream is indicated for the relief of the inflammatory and pruritic manifestations of corticosteroid responsive dermatosis, which is accompanied with fungal infection including yeast and dermatophytes.

Dosage and Administration:

- Apply a thin film of Elicasone-M cream to the affected skin areas once or twice daily, or as directed by a doctor.
- Elicasone-M cream is used with normal dosage in patients 2 years of age or older and used with short period of treatment and small application area in children lower than 2 years.

Pregnancy and Lactation:

As all other topical corticosteroids, drugs of this class should not be used by pregnant women in large amounts or for prolonged periods.

It is not known whether topical administrations of corticosteroids could result in sufficient

systemic absorption to produce detectable quantities in the breast milk, thus a decision should be made whether to discontinue nursing or to discontinue the drug taking into account the importance of the drug to the mother.

Precautions:

Systemic absorption of topical corticosteroids will be increased when used on larger area of the skin.

Use of topical corticosteroids in children should be limited to the least amount compatible with an effective therapeutic regimen.

If irritation or sensitization develops with use of Elicasone-M cream, treatment should be discontinued.

Excessive prolonged use of topical corticosteroids can suppress HPA axis resulting in secondary adrenal insufficiency.

For external use only.

Contraindications:

Elicasone-M Cream is contraindicated in patients who are hypersensitive to Mometasone Furoate, Miconazole Nitrate or to any ingredient in this preparation.

Adverse Reactions:

Very rarely, local adverse reactions are reported with Elicasone-M including burning, pruritus, stinging, signs of skin atrophy, folliculitis, hypertrichosis, and secondary infections.

Storage:

Store between 15-30°C.

Packaging:

Aluminum tube of 20 g.

1- Medicament is a product which affects your health, and its consumption contrary to instructions is dangerous for you.

2- Keep out of reach of children.


Freesia
Pharmaceutical Industries

Produced by Freesia Pharma
Yemen - Sana'a
www.freesiapharma.com

إليكازون-M[®] كريم

التركيب:

كل ١٠٠ غ من إيكازون-M كريم تحتوي على:

موميتازون فيروات ٠,١ غ

ميكونازول نترات ٢ غ

التحذيرات:

- يزداد الامتصاص العام للكورتيكوستيرويدات الموضعية عند علاج مساحات كبيرة من الجلد.
- الاستعمال الموضعي لدى الأطفال يجب أن يكون مقصوراً على المقدار الأدنى المتفق مع النظام العلاجي الفعال.
- في حال حدوث تهيج أو تحسس عند استعمال إيكازون-M كريم يجب إيقاف استعمال الدواء.
- الاستعمال الموضعي لمدة طويلة وبكميات زائدة ينتج عنه قصور كظري ثانوي.
- للاستعمال الخارجي فقط.

موانع الاستعمال:

يجب عدم استعمال إيكازون-M كريم للمرضى الذين لديهم حساسية لمادة الموميتازون فيروات وميكونازول نترات أو لأي عنصر من مكونات هذه التركيبة.

الآثار الجانبية:

نادراً ما سجلت آثار جانبية مع إيكازون-M وتتضمن: حرقه، حكة، لسعة، علامات ضмор الجلد، التهاب الجريبات، زيادة الشعر، التهاب ثانوي.

التخزين:

يحفظ في درجة حرارة بين ١٥ - ٣٠ °م.

الخواص:

موميتازون فيروات مثل باقي الكورتيكوستيرويدات الموضعية له تأثير مضاد للالتهاب والحكة وقابض للأوعية الدموية وذلك من خلال التحكم في إفراز الوسائط المسؤولة عن الالتهابات مثل البروستاجلاندينات والليوكوترينات.

أما ميكونازول نترات فهو مضاد للفطريات ذو تأثير واسع على الفطريات الممرضة والتي تشمل الخمائر والفطريات الجلدية.

الاستطباب:

يستخدم إيكازون-M كريم لعلاج الالتهاب والحكة الجلدية المستجيبة للعلاج بالكورتيكوستيرويدات الموضعية المرافقة مع العدوى الفطرية والتي تشمل الخمائر والفطريات الجلدية.

الجرعة وطريقة الاستعمال:

- تدهن المناطق المصابة من الجلد بطبقة رقيقة من إيكازون-M كريم مرة أو مرتين يومياً أو حسب إرشادات الطبيب.

- يستخدم إيكازون-M كريم بالجرعة الاعتيادية للمرضى الذين أعمارهم أكثر من سنتين ويستخدم لفترات علاجية قصيرة ومساحات تطبيق صغيرة لدى الأطفال الذين أعمارهم أقل من سنتين.

الحمل والإرضاع:

- كما في كل الكورتيكوستيرويدات الموضعية فإن هذه المستحضرات تستخدم في حالات الحمل بكميات قليلة وفترات علاجية قصيرة.
- ليس معلوماً ما إذا كان الامتصاص العام للكورتيكوستيرويدات

التعبئة:

تيوب ألنيوم سعة ٢٠ غ.

- ١- الدواء مستحضر يؤثر على صحتك ، واستهلاكه خلافاً للتعليمات يعرضك للخطر.
- ٢- يحفظ بعيداً عن متناول الأطفال.