

المقياس ١٥,٥ سم × ٤,٢٢ سم

البروفة الثالثة

جيناكس® بويضات مهبلية

الثاني والثالث من الحمل.

التأثيرات الجانبية:

يمكن أن يؤدي استعمال المستحضر للإصابة بإكزيما تحسسية في موضع الاستعمال وخاصة في حالة الاستعمال طول الأمد.

التحذيرات:

- في حال التحسس الموضعي للمستحضر يجب استشارة الطبيب.
- يجب التقيد بالفترة الزمنية المحددة للعلاج من قبل الطبيب.

التدخلات الدوائية:

إن استخدام المستحضر مع المضادات الحيوية من زمرة الأمينوغليكوزيدات يزيد من شدة التحسس لمكونات المستحضر لذلك يجب عدم المشاركة أو مراقبة المريض عند الاضطرار للمشاركة.

الجرعة والاستعمال:

بويضة مهبلية تؤخذ قبل النوم وذلك لمدة ١٢ يوم، أو حسب إرشادات الطبيب.

التخزين:

يحفظ في درجة حرارة أقل من ٢٥°C، في مكان جاف بعيداً عن الضوء.

التعبئة:

علبة كرتونية تحتوي على ٦ بويضات مهبلية.

التركيب:

كل بويضة تحتوي على:

نيومايسين	٣٥,٠٠٠ وحدة دولية
نيستاتين	١٠٠,٠٠٠ وحدة دولية
بوليميكسين B	٣٥,٠٠٠ وحدة دولية

الخواص:

يتمتع جيناكس بطيف تأثير واسع ضد الجراثيم إيجابية الفرام والجراثيم سلبية الفرام والفطريات وذلك لاحتوائه على النيومايسين، والنيستاتين، والبوليميكسين B، كما يتمتع بفعالية عالية ضد التريكوموناس (المشعرات المهبلية) وفطريات الكنديدا.

الاستطباب:

يوصف المستحضر في الحالات التالية:

- الإنثانات المهبلية.
- إنثانات عنق الرحم الجرثومية أو الفطرية.
- السيلان الأبيضي المهيلي (Vaginal Leukorrhea).
- كما يستخدم للوقاية من الإنثانات قبل إجراء العمليات الجراحية في الجهاز التناسلي السفلي.

مضادات الاستطباب:

التحسس لأحد مكونات المستحضر.

الحمل:

لا يستعمل المستحضر في الثلث الأول من الحمل، ويستخدم بحسب إرشادات الطبيب في الثلثين

- ١- الدواء مستحضر يؤثر على صحتك واستهلاكه خلافاً للتعليمات يعرضك للخطر.
- ٢- يحفظ بعيداً عن متناول الأطفال.



إنتاج فريسيافارما
اليمن - صنعاء
www.freesiapharma.com

البروفة الثالثة

Gynax® Vaginal Ovules

Composition:

Each ovule contains:

Neomycin	35000 IU
Nystatin	100000 IU
Polymyxin B	35000 IU

Side Effects:

Allergic eczema in contact application, especially in the long term of treatment.

Precautions:

- In case of sensitivity, consult the doctor.
- A strict adherence to the period of treatment specified by the doctor.

Drug Interactions:

Concomitant use of Gynax with antibiotic of the Aminoglycosides group increases the sensitivity of its ingredients. Therefore, this concomitant should be avoided, or patients should be observed.

Dosage and Administration:

One ovule is inserted in the vagina before bedtime. The treatment course is for 12 days, or as directed by the doctor.

Indications:

Gynax is indicated for the treatment of:

- Vaginal infections.
- Bacterial or fungal cervical infections.
- Vaginal leukorrhea.
- Protection from infections before surgery in lower genital system.

Contraindications:

Hypersensitivity to any ingredients of the drug.

Storage :

Store below 25°C, in a dry place, away from light.

Pregnancy:

It is contraindicated during the first trimester, for the second and third trimester according to the doctor advice.

Packaging:

A packet contains 6 vaginal ovules.

- | |
|---|
| 1- Medicament is a product which affects your health, and its consumption contrary to instructions is dangerous for you . |
| 2- Keep out of reach of children. |



Produced by Freesia Pharma
Yemen - Sana'a
www.freesiapharma.com