المقاس ٥,٥ اسم × ٤,٢٢ سم

ميكو® جل فموي

لعلاج التهابات الفم الفطرية

التركيب،

كل ۱۰۰غ من ميكو جل فموي تحتوي على: ميكونازول ٢غ

الخواص:

يحتوي مستحضر ميكو جل فموي على ميكونازول وهو أحد مشتقات الإميدازولات المصنعة، وهو مضاد فطريات واسع الطيف تتضمن فطريات الجلد و جميع أنواع فطريات الكانديدا بمافيها المبيضة البيضاء (Candida Albicans) وكذلك الفطريات مزدوجة الشكل بالإضافة لفعاليته ضد بعض أنواع البكتيريا موجبة الجرام والبكتيريا المكورة.

لذلك يعتبر ميكو جل فموي مضاد للفطريات والبكتيريا، وخاصة فطريات الفم والفطريات الموية.

ميكونازول تأثيره موضعي وليست له آثار جهازيه ملموسة بسبب ضعف امتصاصه من تجويف الفم والقناة الهضمية.

ميكو جل فموي ذو تركيبة خاصة تضمن التصاقه بالأغشية المبطنة لتجويف الفم والبلعوم والقناة الهضمية لأطول فترة ممكنة للحصول على افضل نتائج علاجية.

الاستطباب:

علاج الالتهابات الفطرية (الفم، الحنجرة، المريء، الأمعاء).

موانع الاستعمال:

الحساسية لمادة الميكونازول أو أحد مكونات المستحضر.

الأعراض الجانبية:

في بعض الحالات تحدث اضطرابات خفيفة في الجهاز الهضمي.

الجرعة وطريقة الاستعمال:

للرضع من عمر٤ أشهر إلى سنتين: ربع ملعقة (ما يعادل ٢٥، ١ مل) ٤ مرات يومياً. للبالغين والأطفال أكبر من سنتين: نصف ملعقة (ما يعادل ٢،٥ مل) ٤ مرات يومياً.

- يجب استخدام الملعقة الصغيرة المتدرجة
 المرفقة لضمان جرعة دقيقة.
- يجب أن يترك الجل في الفم بعض الوقت قبل
 البلع.
- يجب أن يستمر العلاج لمدة أسبوع على الأقل بعد اختفاء الأعراض.

الحمل والإرضاع:

يستخدم بعد استشارة الطبيب.

التخزين:

يحفظ في درجة حرارة أقل من ٣٠ °م.

العبوة:

تيوب سعة ٢٠غ مع ملعقة مدرجة.

الدواء مستحضر يؤثر على صحتك ،واستهلاكه خلافاً للتعليمات يعرضك للخطر.
 حيضظ بعيداً عن متناول الأطفال.



Mico® Oral Gel

For the treatment of fungal infections Composition:

Each 100g of the Mico oral gel contains: Miconazole 2 g

Properties:

Mico oral gel contains Miconazole, a synthetic imidazole derivative, which has strong fungicidal and has antibacterial activity. Its antifungal spectrum includes dermatophytes, Candida Albicans and other Candida species, as well as dimorphic fungi.

Miconazole is also effective against some gram-positive bacilli and cocci.

Accordingly, Mico oral gel is effective in the treatment of common infections of the oral cavity as well as intestinal fungal infections.

Miconazole is poorly absorbed from the gastrointestinal tract, so antifungal and antibacterial activity is exerted in the buccal cavity and the gastrointestinal tract without noticeable systemic side effects.

Mico oral gel is specially formulated for oral use to adhere to the mucosal linings of the bucco pharyngeal cavity and the gastrointestinal tract, so that high fungicidal concentrations are maintained as long as possible to obtain maximal activity.

Indications:

Treatment of oral, pharyngeal and intestinal fungal infections.

Contraindication:

Known hypersensitivity to Miconazole or other ingredients.

Adverse Reactions:

Mild Gastrointestinal disturbances may be observed.

Dosage and Administration:

Infants (from four month of age to two years):

1/4 teaspoonful (Equivalent to 1.25ml) four times daily.

Children above two years and Adults: 1/2 teaspoonful (Equivalent 2.5ml) four times daily.

- -The enclosed graduated teaspoon should be used to ensure the accurate dose.
- -The gel should be kept in the mouth as long as possible before being swallowed.
- -Treatment should be continued at least for one week after the symptoms have disappeared.

Pregnancy and Lactation:

Use the gel after asking the doctor.

Storage:

Store below 30°C.

Packaging:

Aluminum tube of 20 g, with a measuring teaspoon.

- 1- Medicament is a product which affects your health, and its consumption contrary to instructions is dangerous for you .
- 2- Keep out of reach of children.



