

المقياس ١٥,٥ سم × ٤,٢٢ سم

ميوجين بلاس® بوبيضات مهبلية

- يجب أن تتحقق الجرعة عند المرضى المصابين بأمراض كبدية شديدة.
- يجب أن يوقف العلاج عند ظهور علامات اعتلال الأعصاب المحيطية.

التأثيرات الجانبية :

- هذا المستحضر يمكن أن يسبب تهيج أو حكة أو حرقة عند تطبيقه للمرة الأولى وفي حال استمرار الأعراض يجب استشارة الطبيب.
- يمكن أن تحدث آلام في الجسم أو صداع في حالات نادرة.

التدخلات الدوائية :

- يزيد الميترونيدازول والميكونازول من تأثير الوارفارين.
- يزيد السيميتيدين من تركيز الميترونيدازول في البلازما.
- يسرع الفينيتوين من استقلاب الميترونيدازول.

الجرعة وطريقة الاستعمال :

- يتم إدخال بوبيضة واحدة إلى عمق المهبل مرة واحدة في اليوم عند النوم لمدة ٣ أيام متتالية، يجب بقاء المريضية مستلقية على ظهرها بعض الوقت.
- يجب الاستمرار بكمال الجرعة حتى لو اختفت الأعراض بسرعة.
- يمكن تكرار الجرعة بعد استشارة الطبيب.

التخزين :

يحفظ في درجة حرارة أقل من ٢٥°C، في مكان جاف، بعيداً عن الضوء.

التعبئة :

علبة كرتونية تحتوي على ٣ بوبيضات مهبلية.

التركيب :

كل بوبيضة تحتوي على:	ميترونيدازول
٧٥٠ ملغ	ميكونازول نترات

الخواص :

تعطي مادة الميترونيدازول فعالية قوية ضد وحيدات الخلية والجراثيم اللاهوائية والفطريات. وتكون آلية عمله عن طريق تثبيط تصنيع البروتين من خلال التداخل مع DNA الخلية ويسبب في تغيير في بنيتها مما يؤدي إلى موت الخلية.

تعطي مادة الميكونازول مفعول قوي مضاد للخمائر السائدة والفطريات مع التأثير المضاد للبكتيريا ضد بعض الأنواع البكتيرية العصوية موجبة الجرام والمتکورة، وتعمل مادة الميكونازول على تثبيط التكوين الحيوي لمادة الإيرجوستيرويل وكذلك تغيير التركيب الدهني لغلاف الخلوي مما يؤدي إلى موت الخلية الفطرية.

الاستطباب :

- التهابات المهبل الناتجة عن الإصابة بالمشعرات المهبلية.
- التهابات المهبل الناتجة عن الإصابة بالجراثيم اللاهوائية.
- التهابات المهبل الناتجة عن الإصابة بفطريات الكانديدا.
- التهابات المهبل الفطرية الثانوية.
- زيادة الإفرازات المهبلية والحكمة والحرقة الناتجة عن الإصابة بفطريات أو البكتيريا.

التحذيرات :

- في حالة ظهور أعراض حساسية أو تهيج يجب إيقاف العلاج.
- يعطى بحذر شديد للمرضى المصابين بأمراض في

- ١- الدواء مستحضر يؤثر على صحتك، واستهلاكه خلافاً للتعليمات يعرضك للخطر.
- ٢- يحفظ بعيداً عن متناول الأطفال.



إنتاج فريسيما فارما
اليمن - صنعاء
www.freesiapharma.com

MICOGYN Plus® Vaginal Ovules

Composition:

Each ovule contains:

Metronidazole	750 mg
Miconazole nitrate	200 mg

Properties :

- Metronidazole has an activity against protozoa, anaerobic bacteria and fungi. Metronidazole inhibits protein synthesis by interacting with DNA and causing a loss of helical DNA structure. Therefore, it causes cell death.
- Miconazole combines a potent antifungal activity against common dermatophytes and yeasts with an antibacterial activity against certain gram-positive bacilli and cocci. Miconazole inhibits the biosynthesis of ergosterol in fungi and changes the composition of other lipid components in the membrane, resulting in fungal cell necrosis.

Indications:

- Vaginal infections caused by Trichomonas infections (Vaginitis).
- Vaginal infections caused by anaerobic bacterial infections.
- Vaginal infections caused by Candida albicans.
- Mycoses caused by secondary vaginal infection.
- Leukorrhea with itching and burning sensation of the vulva in case of fungal or bacterial infections.

Precautions:

- In case of sensitivity or irritation, treatment should be discontinued.
- It should be used with caution in patients with active disease of central nervous system C.N.S or blood dyscrasias.

1- Medicament is a product which affects your health, and its consumption contrary to instructions is dangerous for you .
2- Keep out of reach of children.

- Doses should be reduced in patients with severe liver diseases.

- Treatment should be discontinued if signs of peripheral neuropathy developed.

Side Effects:

- This medication may cause irritation, itching or burning when it is used for the first time. These effects should disappear as your body adjusts to the medication. If these symptoms persist, consult the doctor.
- In rare cases, symptoms of headache and body ache may occur.

Drug interactions:

- Metronidazole and miconazole increase the effect of warfarin.
- Cimetidine increases plasma concentration of metronidazole.
- Phenytoin accelerates the metabolism of metronidazole.

Dosage and Administration:

- One ovule is inserted deeply intravaginally once daily at bedtime for 3 consecutive days, and the patient must stay lying-down for a while.
- The entire course of treatment should be completed even when the symptoms disappear rapidly.
- Repeat the dosage after consulting the doctor.

Storage:

Store below 25 °C, in a dry place, away from light.

Presentation:

A small carton contains 3 vaginal ovules.



Produced by Freesia Pharma
Yemen - Sana'a
www.freesiapharma.com