

# المقياس ٤٠ سم

## أوراجين® جل فموي

### علاج التهابات وتقرحات الفم واللثة

#### ال التركيب:

##### التحذيرات:

- لا يستخدم للأطفال دون سن ٣ سنوات.

- تجنب بلع المستحضر أو تناول الطعام أو الشراب بعد تطبيق الجل مباشرة.

- استشر الطبيب قبل استعمال أوراجين جل في حال كنت تستخدم بروبرانولول أو سيميتيدين أو مدرات البول.

##### التأثيرات الجانبية:

تُوْجَدُ فِي حَالَاتٍ نَادِرَةٍ جَدًا حَصُولُ وَهَنَّ فِي الْجَسْمِ، صَدَاعٌ، ضَيقٌ تَنْفُسٌ أَوْ حَكَةٌ جَلْدِيَّةٌ.

##### الجرعة:

تُوْجَدُ طبقة من أوراجين جل على الجزء المصابة بالائم أو اللثة كل ٢ ساعتين. أو حسب تعليمات الطبيب.

##### التغزين:

يحفظ في درجة حرارة أقل من ٢٥°C.

##### التعبئة:

تيوب سعة ١٥ غ.

#### الخواص:

أوراجين جل فموي لعلاج التهابات وتقرحات الفم واللثة يحتوي على مادة ليدوكائين هيدروكلوريد التي تعمل كمخدر موضعي قوي بالإضافة مادة سيتيل بيريدينيوم كلوريد وهي مضاد بكتيري واسع الطيف كما تمتاز بتآثيرها المضاد لبعض أنواع الفطريات والفيروسات.

#### دواعي الاستعمال:

يسعمل أوراجين جل كمسكن ألم ومضاد للالتهاب في الحالات التالية:

- تقرحات الفم القلاعية
- التهاب اللثة
- بعد عمليات خلع الأسنان
- التقرحات الناتجة عن أطقم الأسنان

#### موانع الاستعمال:

التحسس لأي مكون من مكونات المستحضر.

#### الحمل والإرضاع:

يستخدم بعد استشارة الطبيب.

- ١- الدواء مستحضر يؤثر على صحتك، واستهلاكه خلافاً للتعليمات يعرضك للخطر.
- ٢- يحفظ بعيداً عن متناول الأطفال.



إنتاج فريسيافارما  
اليمن - صنعاء  
[www.freesiapharma.com](http://www.freesiapharma.com)

# المقياس ٤٠ × ٢٠ سـم

## ORAGEN® Oral Gel

For the treatment of mouth & gum infections & ulcers

### Composition:

Each 100 g of Oragen Gel contains:  
Lidocaine HCl                    2 g.  
Cetylpyridinium Chloride    0.1 g.

### Properties:

Oragen Gel is used for the treatment of oral infections and lesions. It contains Lidocaine HCl which acts as a strong local anesthetic, in addition to Cetylpyridinium Chloride which is a broad-spectrum antibacterial agent, and has antifungal and antiviral activity against some species.

### Indications:

Oragen Gel is used as analgesic and anti-infective agent in case of:

- Mouth ulcers
- Gingivitis
- After dental extraction-
- Denture sores

### Contraindications:

Sensitivity for any of gel ingredients.

### Pregnancy and lactation:

Use the gel after asking the doctor.

### Precautions:

- Do not use for children under 3 years old.
- Avoid swallow the gel or eat and drink after applying it directly.
- Consult the doctor if you are using Propranolol, Cimetidine or diuretics.

### Side effect:

Rare cases of headache, fatigue, shorten breath or pruritus.

### Dosage:

Apply Oragen Gel on the affected area in the mouth or gum each 3 hours, or as directed by a doctor.

### Storage:

Store below 25 °C.

### Packaging:

Tube of 15 g.

1- Medicament is a product which affects your health, and its consumption contrary to instructions is dangerous for you .  
2- Keep out of reach of children.



Produced by Freesia Pharma  
Yemen - Sana'a  
[www.freesiapharma.com](http://www.freesiapharma.com)